



編訂日期:109年11月21日
修訂日期:112年10月24日

肛門膿瘍瘻管

一. 何謂肛門膿瘍及瘻管

在肛門直腸的周圍有許多小腺體，這些小腺體遇到糞便或異物的堵塞或是受到細菌感染時，造成這些小腺體的急性發炎感染、有時伴隨膿液聚集出現，慢慢的在肛門或直腸周圍的組織上成一個膿腫而變成肛門膿瘍。

肛門瘻管是肛門膿瘍的持續進展下的結果，當受到堵塞的發炎腺體與膿腫連接起來形成腔室，持續的擴展直通到直腸肛門口或是肛門旁附近皮膚的開口，形成一條通道，變成肛門瘻管。而肛門瘻管常發生的原因通常是熬夜、免疫力下降、排便習慣不好的時較容易發生，但若不積極治療則會反覆性的復發的機率是非常高。

二. 致病因素

大多是由細菌感染肛門腺體所致，當感染導致膿瘍，加上反覆感染，就會造成肛門瘻管。除此之外，其他疾病或是特定手術也可能導致肛門瘻管出現，包括：結核菌感染、潰瘍性大腸炎、骨盆腔膿瘍、直腸或肛門癌、肛門及會陰之手術或外傷、放射線治療、血癌或淋巴瘤、克隆氏症…等。

三. 肛門膿瘍及瘻管治療

肛門膿瘍的臨床處理約可分為兩種，對淺而小的膿瘍，可在門診直接切開引流，對深而大的膿瘍，則需進開刀房予以麻醉手術引流，引流後的膿瘍，有一半的機會不會再復發，有一半的患者日後會轉變為肛門瘻管。

肛門瘻管是外科疾病，無法單純用藥物而根治，除瘻管切除外，引起發炎的肛門腺也要一併去除才能獲得根治。